# Признаки употребления наркотиков.

#### 1. Общие признаки употребления наркотиков:

#### Внешние признаки:

- бледность кожи;
- расширенные или суженые зрачки;
- покрасневшие или мутные глаза;
- замедленная речь;
- плохая координация движений;
- почесывание лица, тела;
- внешняя неопрятность;
- усиленная потребность в сладком, жидкости (сгущенка, печенье, шоколад, газировка);

### Изменения в поведении:

- увеличивающееся безразличие к происходящему рядом;
- уходы из дома и прогулы в школе;
- трудность в сосредоточении, ухудшение памяти;
- неадекватная реакция на критику;
- частая и неожиданная смена настроения;
- изменение аппетита;
- длительный немотивированный сон в непредусмотренное время;
- частая и неожиданная смена настроения;
- необычные просьбы дать денег;
- пропадают из дома ценности, одежда и др. вещи;
- частые необъяснимые телефонные звонки с использованием сленговых выражений;
- появление новых подозрительных знакомых;

#### Признаки – «улики»

- следы от уколов, порезы, синяки;
- свернутые в трубочку бумажки, маленькие ложечки, капсулы,
- бутылки, пузырьки

## 2. Признаки абстинентного синдрома (ЛОМКА)

### Физические признаки:

• гриппозное состояние (насморк, ломота в мышцах, суставные боли, потение, беспокойный сон либо полное отсутствие сна, постоянное метание (человек не может найти себе место));

• признаки отравления (понос, рвота, головная боль); кашель; на вопрос «Что болит?» могут последовать ответы: «Простыл», «Отравился», «Болят ноги, руки»

#### Психологические признаки:

- раздражительность;
- агрессивность;
- вялость;
- апатия.

<u>Наркомания</u> выражается также в нестабильном артериальном давлении, сухости во рту, снижении половой потенции, нарушении менструального цикла вплоть до полного отсутствия менструаций, похудении, нарушении защитных свойств организма, повышенная тяга к сладкому. Во всех случаях употребления наркотиков ждите, что употребивший наркотик будет сторониться общения и избегать встреч лицом к лицу с другими.